

Lea detenidamente estas instrucciones de uso, ya que contienen información importante sobre la forma de utilizar el producto. Si tiene alguna duda, consulte a su farmacéutico, a su médico, a su profesional del cuidado de la visión o póngase en contacto con nosotros.

BAUSCH + LOMB

Artelac® Rebalance

Ácido hialurónico al 0,15 % (en forma de hialuronato sódico), polietilenglicol 8000 al 0,5 % (PEG 8000) y electrolitos esenciales.

Uso previsto:

Lubricante ocular y humectante de lentes de contacto.

¿Qué es Artelac® Rebalance?

Artelac® Rebalance es un colirio en solución, transparente, de color rosado, que contiene ácido hialurónico al 0,15% (en forma de hialuronato sódico), polietilenglicol 8000 al 0,5 % (PEG 8000), cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de sodio, vitamina B12, agua estéril, ácido bórico y Oxyd® (un suave conservante que se transforma en agua, oxígeno y sal al entrar en contacto con la superficie del ojo).

Una vez abierto puede utilizarse durante 2 meses.

¿Para qué se utiliza Artelac® Rebalance?

Artelac® Rebalance es un lubricante ocular - en un práctico frasco - idóneo para aliviar y calmar los síntomas persistentes de ojo seco.

Artelac® Rebalance es compatible con todo tipo de lentes de contacto, tanto blandas como rígidas, mientras se llevan puestas, y mejora considerablemente la sensación de confort durante todo el día.

¿Cuándo debes utilizar Artelac® Rebalance?

Contiene componentes clave que se encuentran de forma natural en el ojo y en las lágrimas: hialuronato sódico (un humectante efectivo), nutrientes e iones purificados, como potasio, magnesio, sodio y calcio. PEG 8000 es un humectante adicional que mantiene la duración de la hidratación. La vitamina B12 da a Artelac® Rebalance su color rosado, que desaparece rápidamente al parpadear. No mancha la ropa ni las lentes de contacto.

Artelac® Rebalance está diseñado para mantenerse en la superficie ocular y ofrecer una humectación duradera para combatir todos los síntomas de ojo seco, al añadir componentes esenciales a la película lagrimal natural. Es un producto ideal para aquellas personas que sufren diversos síntomas de ojo seco, como ojos cansados, con escozor o lagrimeo.

La sequedad ocular está causada por:


- Factores externos, como el uso prolongado del ordenador, el aire acondicionado, la calefacción y el humo del tabaco, así como el viento o el uso de lentes de contacto.
- Hay otros factores, como determinados fármacos (píldora anticonceptiva, antihistamínicos, betabloqueantes, antiespasmódicos y diuréticos) y algunas enfermedades, que pueden desempeñar un papel importante en la sequedad ocular.

¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se puede utilizar Artelac® Rebalance?

Instile en el ojo una gota de Artelac® Rebalance 3-5 veces al día o con mayor frecuencia si es necesario. Puede utilizarlo todos los días y con la frecuencia que desee. No hay ninguna limitación sobre el tiempo de uso.

¿Cómo se utiliza Artelac® Rebalance?

1. Retire el tapón protector del envase antes de cada uso. Asegúrese de no tocar el extremo del envase con los dedos.



2. Inclíne ligeramente la cabeza hacia atrás, tire suavemente del párpado inferior con un dedo de la mano libre y sujete el frasco en posición vertical sobre el ojo, con el envase hacia abajo. Apriete suavemente el envase para aplicar una gota.



Procure que el extremo del envase no entre en contacto con el ojo ni con los dedos para evitar que la solución se contamine.

3. Vuelva a colocar el tapón en el envase después de cada uso.



¿Cuándo no debes utilizar Artelac® Rebalance?

No utilice el producto si presenta hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Información importante sobre el uso de Artelac® Rebalance

- En raras ocasiones se han registrado reacciones de hipersensibilidad local. Si esto sucede, deberá interrumpirse el tratamiento.
- No toque el ojo con el extremo del envase para evitar posibles lesiones en la superficie ocular y que la solución se contamine.
- Espere unos 15 minutos antes de utilizar otro producto ocular.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad.
- No utilice el producto si observa algún daño en el envase.
- Deseche el producto 2 meses después de su apertura.

Conservación de Artelac® Rebalance:

Almacenar a temperaturas comprendidas entre 1º C y 25º C. Mantener alejado de la luz solar directa.

Presentación:

Artelac® Rebalance se presenta en forma de colirio en envases de 10 ml. El producto también está disponible en cómodas unidades monodosis, siempre sin conservantes.

CE 0483



Fabricante:
Dr. Gerhard Mann.
Chem.- pharm. fabrik GmbH
Brünstütteler Damm 165-
173
13581 Berlín
Alemania

Distribuido por:
Bausch & Lomb S.A.
Avda. Valdelaparra 4.
28108 Alcobendas, Madrid

®/™ son marcas registradas
por Bausch & Lomb
Incorporated o sus filiales.
©Bausch & Lomb
Incorporated.



No utilice el producto si el envase está dañado.



Deseche el producto
2 meses después de su
apertura.



Mantener alejado
de la luz solar directa



Fecha de caducidad



Lea las instrucciones
de uso



Lote

STERILE A

Esterilización por técnica
aséptica



Conserve el producto
a un rango de temperatura
comprendido entre
+1°C y +25°C

Artelac® Rebalance, Febrero 2017